PROBLEMA 1.

a) Poiché il triangolo ABC è metà di un triangolo equilatero di lato a , i lati del triangolo misurano

$$\overline{AC} = \frac{a}{2} \text{ e } \overline{BC} = \frac{a}{2}\sqrt{3}. \text{ Le limitazioni da imporre a } x \text{ affinché la costruzione sia realizzabile sono}$$

$\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}\sqrt{3}$, che corrispondono ai casi in cui, rispettivamente, il punto R o il punto Q coincidono con C .

b) L'area del quadrilatero mistilineo richiesta si può calcolare sottraendo dall'area del triangolo ABC l'area dei settori circolari APR e BQP . Si ottiene

$$S(x) = \frac{1}{2}\overline{AC} \cdot \overline{BC} - \frac{1}{6}\pi\overline{AP}^2 - \frac{1}{12}\pi\overline{PB}^2 = \frac{a^2}{8}\sqrt{3} - \frac{\pi}{6}(a-x)^2 - \frac{\pi}{12}x^2, \text{ la cui derivata prima è}$$

$$S'(x) = \frac{\pi}{3}(a-x) - \frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{3}a - \frac{\pi}{2}x. \text{ Dallo studio del segno di } S'(x), \text{ risulta che il valore massimo}$$

di tale area si ha per $x = \frac{2}{3}a$ e vale $S\left(\frac{2}{3}a\right) = a^2\left(\frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{\pi}{18}\right)$, mentre il valore minimo si ottiene per

$$x = \frac{a}{2}\sqrt{3} \text{ e vale } S\left(\frac{a}{2}\sqrt{3}\right) = a^2\left(\frac{\sqrt{3}}{8} + \pi\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{17}{48}\pi\right).$$

c) Chiamando $\overline{LM} = x$, cioè la misura del lato del rettangolo inscritto che si trova su AB , con

$0 < x < a$, per similitudine tra i triangoli ABC , AEC e KHC si ha $\overline{CE} = \frac{a}{4}\sqrt{3}$, $\overline{CK} = \frac{x}{2}$,

$\overline{CD} = \frac{x}{4}\sqrt{3}$, quindi $\overline{DE} = \overline{CE} - \overline{CD} = \frac{a}{4}\sqrt{3} - \frac{x}{4}\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}(a-x)$. L'area del rettangolo è

$$R(x) = \overline{LM} \cdot \overline{DE} = x \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(a-x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(ax - x^2), \text{ con derivata } R'(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(a-2x). \text{ L'area è}$$

massima se $x = \frac{a}{2}$ e in tal caso vale $R\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{16}a^2$.

d) W è costituito da due piramidi non rette che hanno come base il quadrato di lato CE e altezze AE

ed EB , quindi $V_w = \frac{1}{3}\overline{CE}^2 \cdot \overline{AE} + \frac{1}{3}\overline{CE}^2 \cdot \overline{EB} = \frac{1}{3}\overline{CE}^2 \cdot (\overline{AE} + \overline{EB}) = \frac{1}{3}\overline{CE}^2 \cdot \overline{AB} = \frac{1}{3}\left(\frac{a}{4}\sqrt{3}\right)^2 \cdot a = \frac{a^3}{16}$.

PROBLEMA 2.

- a) Per la simmetria della figura, il punto Q di intersezione fra Γ e Γ_1 si trova ad una distanza dal diametro AB pari alla metà del raggio. Chiamando R la sua proiezione ortogonale sul diametro AB , e O quella sul raggio CK perpendicolare ad AB , si ha $\overline{RQ} = \frac{1}{2} = \overline{OC}$, $\widehat{RQO} = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$ e $\overline{CR} = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \overline{OQ}$. Calcolando le aree si

trova $A_{OCQ} = \frac{1}{2} \overline{OQ} \cdot \overline{OC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8} = A_{KOQ}$, $A_{KCO} = \frac{\pi}{6}$

(in quanto settore circolare con angolo al centro di 60° , appartenente ad un cerchio di raggio 1). Quindi l'area del triangolo mistilineo OQC si ricava per differenza ed è data

da $A_{OQC} = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$ e l'area richiesta è

$$A_{richiesta} = 4 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right).$$

- b) Indicando con D il vertice del rettangolo appartenente all'arco BK , e con E la sua proiezione sul diametro AB , e ponendo $\overline{CE} = x$, con $0 < x < 1$, si ha $\overline{DE} = \sqrt{1-x^2}$. L'area del rettangolo è data da $S(x) = 2 \cdot \overline{CE} \cdot \overline{DE} = 2x\sqrt{1-x^2}$.

Conviene massimizzare la funzione $g(x) = S^2(x) = 4x^2 - 4x^4 = 4(x^2 - x^4)$ la cui derivata prima $g'(x) = 4(2x - 4x^3) = 8x(1 - 2x^2)$ si annulla per $x = 0$ e

$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Dallo studio del segno di $g'(x)$ e tenendo conto

delle limitazioni per x , si ha il massimo per $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ con

area 1.

- c) Per motivi geometrici, $0 < x < \frac{\pi}{2} \vee \frac{\pi}{2} < x < \pi$.

Nel caso $0 < x < \frac{\pi}{2}$, per i teoremi sui triangoli

rettangoli, $\overline{PH} = \overline{PC} \sin x = \sin x$,

$\overline{CH} = \overline{PC} \cos x = \cos x$,

$\overline{AH} = 1 + \cos x$,

quindi $S_1(x) = \frac{1}{2} \overline{AH} \cdot \overline{PH} = \frac{1}{2} (1 + \cos x) \sin x$ e $S_2(x) = \frac{1}{2} \overline{CH} \cdot \overline{PH} = \frac{1}{2} \cos x \sin x$,

pertanto $f(x) = \frac{S_1(x)}{S_2(x)} = \frac{(1 + \cos x) \sin x}{\cos x \sin x} = \frac{1 + \cos x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} + 1$.

Nel caso invece $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ si ottiene $f(x) = -\frac{1 + \cos x}{\cos x}$

d) Prescindendo dai limiti geometrici del problema, come il testo richiede, consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1 + \cos x}{\cos x}$. Essa è periodica di periodo 2π , definita se $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Restringendo l'analisi all'intervallo $[0; 2\pi]$, osserviamo che $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^{\pm}} f(x) = \mp \infty$ (quindi f ammette infiniti asintoti verticali di equazione $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$).

Conoscendo il grafico della funzione $y = \cos x$, possiamo affermare che la funzione f è positiva e crescente in $]0; \frac{\pi}{2}[$, negativa e crescente in $]\frac{\pi}{2}; \pi[$, negativa e decrescente in $]\pi; \frac{3}{2}\pi[$, positiva e decrescente in $]\frac{3}{2}\pi; 2\pi[$ e ammette minimi in $(0; 2)$ e $(2\pi; 2)$ e massimo in $(\pi; 0)$. Segue la rappresentazione grafica.

Si precisa che $f(x) = \sec x + 1$.

Con ragionamento analogo al precedente si può ottenere il grafico della funzione nel secondo caso.

QUESTIONARIO

1. La proposizione è falsa: come controesempio basta considerare lo stesso parallelepipedo appoggiato su due basi diverse, come si può veder in figura.

Vale invece l'implicazione inversa (principio di Cavalieri).

2. Detto r il raggio del cerchio, applicando il teorema della corda si può ricavare il lato del decagono inscritto $l = 2r \sin \frac{\pi}{10}$ [1]. La sezione aurea di un segmento è il segmento medio proporzionale tra il segmento stesso e la parte rimanente quindi dalla proporzione $r:l = l:(r-l)$ si ottiene $l = \frac{\sqrt{5}-1}{2}r$. Sostituendo nella [1] si ottiene la tesi.

3. Indicato con x e h rispettivamente il raggio di base e l'altezza del cilindro ($x, h > 0$) l'area S può essere scritta $S = A_{\text{base}} + A_{\text{lato}} = 2\pi x h + \pi x^2$ da cui $h = \frac{S - \pi x^2}{2\pi x}$. Il volume richiesto è quindi

$$V(x) = \pi x^2 \frac{S - \pi x^2}{2\pi x} = \frac{1}{2}(Sx - \pi x^3)$$
 la cui derivata prima risulta $V'(x) = \frac{1}{2}(S - 3\pi x^2)$. Dallo

studio del segno di $V'(x)$ si ottiene che la cassetta ha volume massimo quando $x = \sqrt{\frac{S}{3\pi}} = h$ e quindi quando la sua altezza è uguale al raggio di base.

4. Si rimanda al manuale per la regola di *de L'Hôpital*. Per la dimostrazione del risultato richiesto si può notare che applicando successivamente la regola 2008 volte si ottiene:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2008}}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2008!}{2^x \cdot (\ln 2)^{2008}} = 0$$

5. Se $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, risulta $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ ed imponendo $P(0) = d = 0$, $P'(0) = c = 0$, $P(1) = a + b = 0$, si ottiene $P(x) = ax^3 - ax^2$. Considerando

$$\int_0^1 (ax^3 - ax^2) dx = a \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = a \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = -\frac{1}{12}a = \frac{1}{12}$$
 si ottiene infine $a = -1$ da cui $P(x) = -x^3 + x^2$

6. Una progressione si definisce aritmetica se la differenza tra un termine ed il precedente è costante, pertanto si ha che $\binom{n}{2} - \binom{n}{1} = \binom{n}{3} - \binom{n}{2}$, con $n > 3$. Sviluppando mediante i

coefficienti binomiali si giunge a $\frac{n!}{2!(n-2)!} - \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{3!(n-3)!} - \frac{n!}{2!(n-2)!}$ che diventa $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} - \frac{n(n-1)}{2}$. Svolgendo i calcoli e semplificando per $n(n-2)$ (possibile, per le condizioni del testo) si ottiene la soluzione $n = 7$.

7. L'equazione $k = 3x^2 - x^3$ può essere risolta graficamente rappresentando la cubica di equazione $y_1 = 3x^2 - x^3$ (che presenta massimo in $(2, 4)$ e minimo in $(2, 0)$) e il fascio di rette orizzontali di equazione $y_2 = k$.

Osservando il grafico in figura risulta che per $k < 0 \vee k > 4$ l'equazione data ha una soluzione, se $k = 0 \vee k = 4$ l'equazione data ha tre soluzioni (di cui due coincidenti), se $0 < k < 4$ l'equazione ha tre soluzioni distinte.

8. Il dominio della funzione f è $]0; +\infty[$; le derivate prima e seconda sono rispettivamente

$$f'(x) = \pi^x \ln \pi - \pi \cdot x^{\pi-1}$$

$$f''(x) = \pi^x \ln^2 \pi - \pi(\pi-1) \cdot x^{\pi-2}$$

Poiché $\pi > e$ si ha $\ln \pi > 1$ pertanto nel punto $x = \pi$ le due derivate valgono rispettivamente

$$f'(\pi) = \pi^\pi (\ln \pi - 1) > 0 \quad \text{e} \quad f''(\pi) = \pi^\pi \left(\ln^2 \pi + \frac{1}{\pi} - 1 \right) > 0.$$

9. Poiché $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x-1) = -2$, il limite non esiste, ma esistono i due limiti destro e sinistro e sono diversi.

10. L'inclinazione della strada si può determinare mediante il teorema dei triangoli rettangoli: detto α l'angolo alla base del triangolo rettangolo che ha come ipotenusa il percorso di $1,2 \text{ km}$ e come altezza il dislivello di 85 m , si ha $\text{sen} \alpha = \frac{85 \text{ m}}{1200 \text{ m}}$, quindi $\alpha = 4^\circ 3' 43''$. La pendenza si calcola facendo il rapporto tra altezza e base del suddetto triangolo ed è pertanto pari a $\frac{85 \text{ m}}{85 \text{ m} \cdot \cotan \alpha} = \tan \alpha \approx 0,07$.

Allo stesso risultato si può giungere applicando il teorema di Pitagora per determinare la lunghezza della base del triangolo. La percentuale da riportare sul segnale è quindi del 7%.

Soluzione a cura di: **Alessandra Biglio**, Liceo Classico "Vittorio Alfieri" di Torino,
Giuliana Brun, Liceo Scientifico "Isaac Newton" di Chivasso,
Antonella Cuppari, Liceo Scientifico "Piero Gobetti" di Torino,
Giovanna Rovero, già docente di Liceo Scientifico